

有機農産物JAS表A, 1適合資材 オール有機の液肥

高機能のアミノ酸・有機酸濃縮液

特殊肥料



ソイルサプリエキス®

含有成分


当社分析例

チッソ	リン酸	カリ	有機酸	腐植 (腐植酸+フルボ酸)	遊離アミノ酸	全糖	pH
3%前後	1%前後	1%前後	約3%	約5%	約3.5%	約12%	4前後

※含有アミノ酸はプロリン、アラニン、グルタミン酸、アスパラギン酸、グリシン、リジン 他



- ◎有機酸、各種アミノ酸、腐植酸を豊富に含みます。
- ◎有機酸は土壌のミネラルやリン酸の吸収を高めます。
- ◎土壌中の有用微生物の増殖を促進し、地力を高めまう。
- ◎根張り、生育向上、品質向上が期待でき、成り疲れ解消にも役立ちます。



※オール有機ですので希釈した液は
使い切ってください。

※アルカリ剤との混用は避けてください。



ソイルサプリエキス
キャベツ 葉面散布試験


ソイルサプリエキス
ブロッコリー苗 散布試験

供給 JAグループ

製造 KCC 片倉コープアグリ株式会社



ソイルサプリエキス施肥方法 一覧



作物	ステージ	施肥方法	希釈倍率	備考1	備考2
水稻	育苗期	葉面散布	200倍以上	500ml/1箱	
	田植え前	弁当肥	200倍以上	500ml/1箱	
	中干後入水時	流し込み	原液	4~8kg/10a 水口設置	
大豆	種子コーティング		原液	大豆1kgに対し原液2ml	
	播種前 圃場	土壌散布	300倍以上		
	2~4葉期まで	葉面散布	300倍以上	1~2回 散布	4葉期以降は散布を控える
人参	播種後	土壌散布	300倍以上		
	定植後	土壌散布	300倍以上		
		葉面散布	500倍以上	適時散布	
西瓜	定植時	ドブ漬け	100倍以上		
	定植後	土壌灌水	300倍以上		
		葉面散布	500倍以上	適時散布	
トマト ナス等 果菜類	育苗期	葉面散布	500倍以上	発芽3~5日後から	以降適時散布
	定植前 圃場	土壌散布	100倍以上		
	定植時	ドブ漬け	100倍以上		
		活着肥	200倍以上	根付水として	
	定植後	灌水	300倍以上	トミー液肥等と混用可	
キャベツ レタス等 葉菜類	育苗期	葉面散布	500倍以上	発芽3~5日後から	以降適時散布
	定植苗	弁当肥	200倍以上		
	定植時	ドブ漬け	100倍以上		
		土壌灌水	200倍以上		
	定植後	葉面散布	300倍以上	適時散布	
果樹類	育苗期	葉面散布	500倍以上	発芽3~5日後から	以降適時散布
	定植時	弁当肥	100倍以上		
		活着肥	200倍以上	根付水として	
	定植後	葉面散布	200倍以上	適時散布	
		灌水	100倍以上	樹幹周りに灌水	落葉期 土づくり
馬鈴薯	種イモコーティング		5倍以上	しっかり風乾してください	処理後は液肥として利用

