



根張り促進型肥料

ライゾー

アミノ酸で

根張り強化!

高温対策!

■成分

保証成分量	
窒素全量	8.0%
く溶性りん酸	4.0%

その他の成分	
アミノ酸…	58.0%

RHYZO

根張り促進型肥料
ライゾー
1kg



株式会社 ハイポネックス ジャパン

植物由来の天然資材で株元をしっかりと！ぐらつかず安定！

特長

- リン酸、植物由来のメチオニンをはじめとしたアミノ酸類およびビタミン類が、作物の根を活性化させることで根張りを促進させます。
- 主根・二次および三次根や根毛の伸長、さらにダメージを受けた根の再生に効果があり、ストレスを与えることなく、植物が本来持っている生長機能を引き出します。



性状：粉末



1kg

施用事例

根張りの違いが明らかに！

■ピーマン



未使用



ライゾー使用

根毛に差がつく！

■ピーマン



未使用



ライゾー使用

育苗からの施用が有効！

■ブロッコリー




未使用



ライゾー使用

ライゾーの効果



58%の植物由来のL-アミノ酸（メチオニンなど3種類）が二次根・三次根や根毛の伸長を促進させます。

施用方法

作物	施用時期			施用量・倍率
葉菜類	プラグ苗	育苗期	1週間間隔で2～3回	3,000～5,000倍
	圃場	根張りを強化したい時	1週間間隔で2～3回、葉面散布もしくは灌注	
果菜類	ポット苗	育苗期	2週間に1～2回	100g/10aを希釈、または5,000倍
	圃場	定植後1ヵ月間	1週間間隔で1～3回	
		生育期	2週間に1～2回定期的	
		成り疲れしそうな時	1週間間隔で3回	
花き類	ポット苗／プラグ苗	育苗期	2週間に1～2回	3,000～5,000倍
	圃場	定植後1ヵ月間	1週間間隔で3回	
		生育期	2週間に1～2回定期的	100g/10aを希釈、または5,000倍
		樹勢が弱くなっている時	1週間間隔で2～3回	
果樹類	圃場	苗木生産～新植時	1週間間隔で3回	3,000～5,000倍
		春先の新芽が動き始める時	1週間間隔で2～3回	100g/10aを希釈、または5,000倍
		根が弱っている時		
水稻	育苗箱	育苗期	2週間に1～2回	3,000～5,000倍

*急な根傷みや、多灌水による根傷みの場合は、集中的に1,000～3,000倍で施用して根の回復を図ります。

*施用量、施用回数は目安のため栽培条件で変わることがあります。一度お試しのうえ、ご使用ください。